



موج ۲۰


مرحله‌ای
و جامع

ویژه آمادگی شرکت در امتحان‌های نهایی و نیم‌سال

حسابان دوازدهم

(ریاضی)

شیدا شاداب



امتحان‌های
درس به درس

درس‌نامه برای
مرور مطالب

امتحان‌های
شبیه‌ساز نهایی

امتحان‌های
نیم‌سال اول و
دوم

امتحان‌های
فصل به فصل

پاسخ‌های
تشریحی +
کلید تصحیح

نکات آموزشی
برای مرور

امتحان‌های
نهایی اخیر

در ابتدا باید یک خدافت جانانه به شما دانش آموزان عزیز دوازدهمی بگویم که در حال عبور از یکی از سال‌های پرچالش زندگی‌تان هستید. در این مسیر، یکی از اهداف مهم شما کسب نمره مناسب در امتحان نهایی است. خوشحالم که این کتاب را انتخاب کرده‌اید و با اطمینان به شما می‌گویم که با مطالعه آن، کسب نمره ۲۰ برای شما آسان می‌شود.

این کتاب کاملاً در چارچوب کتاب درسی نوشته شده است و دارای ویژگی‌های زیر است:

۱) دارای درس‌نامه‌ای مختصر، کامل و مفید با عنوان مرورنامه است. مرورنامه به شما کمک می‌کند تمام مطالب کتاب درسی را به آسانی مرور کنید. همچنین در مرورنامه مثال‌های خوب و کاربردی آورده شده است تا بتوانید مفاهیم و نکات را بهتر درک کنید.

۲) آزمون‌محور است. بدین صورت که با آزمون‌های مختلف مطالب کتاب درسی بیان می‌شود؛

۳) پاسخنامه آزمون‌ها بر اساس پاسخنامه‌های امتحانات نهایی بارم‌بندی شده است. شما می‌توانید با مطالعه دقیق آن‌ها به این موضوع پی ببرید که قسمت‌های مهم در نوشتن پاسخ چیست؛

۴) همه مطالب کتاب درسی در آزمون‌ها پوشش داده شده‌اند. در این آزمون‌ها هر مطلب کتاب درسی را در قالب حداقل یک مسئله مشاهده می‌کنید؛

۵) این کتاب برای هر دانش آموز در هر سطحی مناسب است. دانش آموزان توانمند از این کتاب می‌توانند برای بهبود روش نوشتن خود استفاده کنند. همچنین دانش آموزانی که هنوز به هر دلیلی نتوانسته‌اند به مطالب کتاب درسی تسلط پیدا کنند، می‌توانند در زمان کوتاه نمره مناسبی کسب کنند. این کتاب دارای ۳۸ آزمون، شامل آزمون‌های ۱۰ نمره‌ای و ۲۰ نمره‌ای است. آزمون‌های درس به درس و آزمون‌های فصل ۱۰ نمره‌ای هستند و آزمون‌های نیم‌سال اول، نیم‌سال دوم و جامع (تألیفی و نهایی سال‌های اخیر) ۲۰ نمره‌ای.

نوع آزمون	تعداد آزمون‌ها	توضیحات
درس به درس	۱۲	هر درس ۱ آزمون
آزمون فصل	۵	هر فصل ۱ آزمون
نیم‌سال اول	۴	فصل اول، فصل دوم و فصل سوم
نیم‌سال دوم	۲	فصل چهارم و فصل پنجم
جامع - شبیه‌ساز نهایی	۵	تمام کتاب
نهایی ۱۴۰۲	۳	تمام کتاب
نهایی ۱۴۰۳	۳	تمام کتاب
نهایی ۱۴۰۴	۳	تمام کتاب
نهایی ۱۴۰۵	۱	تمام کتاب

آزمون‌های جامع کاملاً تألیفی هستند و بودجه‌بندی آن‌ها بر اساس امتحان نهایی است. اما در سایر آزمون‌ها از سؤالات امتحانات نهایی سال‌های گذشته نیز استفاده شده است. این موضوع به ما و شما کمک می‌کند که به مهم‌ترین هدف کتاب برسیم و آن کسب نمره ۲۰ در امتحان نهایی حسابان ۲ است. در پایان هر خود لازم می‌دانم از همکاران عزیزمان در نشر الگو، خانم فهیمه گودرزی برای مطالعه و ویراستاری علمی کتاب، خانم فاطمه احدی برای صفحه‌آرایی، خانم مرضیه کریمی برای رسم شکل‌ها و خانم ستین مختار مسئول واحد ویراستاری و حروف‌چینی تشکر و قدردانی کنم.

فهرست مطالب

۴۴ مرورنامه فصل پنجم - درس اول

۴۸ آزمون ۱۸: فصل پنجم - درس اول

۴۹ مرورنامه فصل پنجم - درس دوم

۵۲ آزمون ۱۹: فصل پنجم - درس دوم

۵۳ مرورنامه فصل پنجم - درس سوم

۵۵ آزمون ۲۰: فصل پنجم - درس سوم

۵۵ آزمون ۲۱: فصل پنجم - درس سوم

۵۷ آزمون ۲۲: نیم‌سال دوم (۱)

۵۸ آزمون ۲۳: نیم‌سال دوم (۲)

۵۹ آزمون ۲۴: جامع (۱) - شبیه‌ساز نهایی

۶۱ آزمون ۲۵: جامع (۲) - شبیه‌ساز نهایی

۶۳ آزمون ۲۶: جامع (۳) - شبیه‌ساز نهایی

۶۴ آزمون ۲۷: جامع (۴) - شبیه‌ساز نهایی

۶۶ آزمون ۲۸: جامع (۵) - شبیه‌ساز نهایی

۶۷ آزمون ۲۹: جامع (۶) - نهایی خرداد ۱۴۰۲

۶۹ آزمون ۳۰: جامع (۷) - نهایی شهریور ۱۴۰۲

۷۰ آزمون ۳۱: جامع (۸) - نهایی دی ۱۴۰۲

۷۱ آزمون ۳۲: جامع (۹) - نهایی خرداد ۱۴۰۳

۷۳ آزمون ۳۳: جامع (۱۰) - نهایی شهریور ۱۴۰۳

۷۴ آزمون ۳۴: جامع (۱۱) - نهایی دی ۱۴۰۳

۷۶ آزمون ۳۵: جامع (۱۲) - نهایی خرداد ۱۴۰۴

۷۷ آزمون ۳۶: جامع (۱۳) - نهایی شهریور ۱۴۰۴

۸۰ پاسخ‌های تشریحی

۱۴۰ آزمون ۳۷: جامع (۱۴) - نهایی دی ۱۴۰۴

۱۴۱ آزمون ۳۸: جامع (۱۵) - نهایی تیر ۱۴۰۵

۱۴۲ پاسخ تشریحی آزمون (۳۷)

۱۴۴ پاسخ تشریحی آزمون (۳۸)

آزمون‌های مرحله‌ای و جامع

۲ مرورنامه فصل اول - درس اول

۵ آزمون ۱: فصل اول - درس اول

۶ مرورنامه فصل اول - درس دوم

۹ آزمون ۲: فصل اول - درس دوم

۱۰ آزمون ۳: فصل اول - درس دوم

۱۲ مرورنامه فصل دوم - درس اول

۱۳ آزمون ۴: فصل دوم - درس اول

۱۴ مرورنامه فصل دوم - درس دوم

۱۵ آزمون ۵: فصل دوم - درس دوم

۱۶ آزمون ۶: فصل دوم - درس دوم

۱۷ مرورنامه فصل سوم - درس اول

۲۰ آزمون ۷: فصل سوم - درس اول

۲۱ مرورنامه فصل سوم - درس دوم

۲۴ آزمون ۸: فصل سوم - درس دوم

۲۵ آزمون ۹: فصل سوم - درس دوم

۲۶ آزمون ۱۰: نیم‌سال اول (۱)

۲۸ آزمون ۱۱: نیم‌سال اول (۲)

۲۹ آزمون ۱۲: نیم‌سال اول (۳)

۳۱ آزمون ۱۳: نیم‌سال اول (۴)

۳۳ مرورنامه فصل چهارم - درس اول

۳۴ آزمون ۱۴: فصل چهارم - درس اول

۳۶ مرورنامه فصل چهارم - درس دوم

۳۹ آزمون ۱۵: فصل چهارم - درس دوم

۴۰ مرورنامه فصل چهارم - درس سوم

۴۱ آزمون ۱۶: فصل چهارم - درس سوم

۴۲ آزمون ۱۷: فصل چهارم - درس سوم

مرورنامه

فصل اول - درس دوم


تابع درجه سوم، توابع یکنوا، بخش پذیری و تقسیم

توابع چندجمله‌ای


تابع چندجمله‌ای از درجه n

هر تابع با دامنه $\mathbb{R}$ را که ضابطه آن به صورت $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ است، که در اینجا n عددی صحیح و نامنفی است، $a_0, a_1, \dots, a_n$ و $a_n \neq 0$ ، تابعی چندجمله‌ای از درجه n می‌نامند.

تذکر توجه کنید که برای $f(x) = 0$ درجه تعریف نمی‌شود.




نمودار تابع چندجمله‌ای درجه ۳ با ضابطه $f(x) = x^3$ به صورت روبه‌رو است. چون هر خط موازی محور x نمودار این تابع را قطع می‌کند، پس برد این تابع $\mathbb{R}$ است (توجه کنید که طبق تعریف، دامنه این تابع هم $\mathbb{R}$ است). همین‌طور چون هر خط موازی محور x این نمودار را دقیقاً در یک نقطه قطع می‌کند، پس این تابع یک‌به‌یک نیز هست. به این ترتیب، تابع f وارون پذیر است و چون



پس $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$. توجه کنید که چون $D_f = R_f = \mathbb{R}$ ، پس $D_{f^{-1}} = R_{f^{-1}} = \mathbb{R}$.

نمودار تابع f^{-1} قرینه نمودار تابع f نسبت به خط $y = x$ است، که در شکل روبه‌رو نشان داده شده است.




برای رسم نمودار تابع $y = x^3 + 1$ ، ابتدا نمودار تابع $y = x^3$ را رسم می‌کنیم، سپس این نمودار را یک واحد به بالا انتقال می‌دهیم تا نمودار تابع $y = x^3 + 1$ به دست بیاید. برای رسم نمودار تابع $y = (x+1)^3$ ، ابتدا نمودار تابع $y = x^3$ را رسم می‌کنیم، سپس این نمودار را یک واحد به سمت چپ انتقال می‌دهیم تا نمودار تابع $y = (x+1)^3$ به دست بیاید.

مثال

توابع صعودی و توابع نزولی


توابع اکیداً یکنوا و یکنوا



• تابع f را روی مجموعه A ($A \subseteq D_f$) اکیداً صعودی می‌نامند، به شرطی که به ازای هر a و b در مجموعه A ،

$$a < b \Rightarrow f(a) < f(b)$$

اگر $A = D_f$ ، می‌گوییم تابع f روی دامنه‌اش اکیداً صعودی است.



• تابع f را روی مجموعه A ($A \subseteq D_f$) اکیداً نزولی می‌نامند، به شرطی که به ازای هر a و b در مجموعه A ،

$$a < b \Rightarrow f(a) > f(b)$$

اگر $A = D_f$ ، می‌گوییم تابع f روی دامنه‌اش اکیداً نزولی است.




• اگر تابع f روی مجموعه A ($A \subseteq D_f$) اکیداً صعودی یا اکیداً نزولی باشد، می‌گوییم تابع f روی مجموعه A اکیداً یکنواست.

• تابع f را روی مجموعه A ($A \subseteq D_f$) صعودی می‌نامند، به شرطی که به ازای هر a و b در مجموعه A ،

$$a < b \Rightarrow f(a) \leq f(b)$$

اگر $A = D_f$ ، می‌گوییم تابع f روی دامنه‌اش صعودی است.



• تابع f را روی مجموعه A ($A \subseteq D_f$) نزولی می‌نامند، به شرطی که به ازای هر a و b در مجموعه A ،

$$a < b \Rightarrow f(a) \geq f(b)$$

اگر $A = D_f$ ، می‌گوییم تابع f روی دامنه‌اش نزولی است.


• اگر تابع f روی مجموعه A ($A \subseteq D_f$) صعودی یا نزولی باشد، می‌گوییم تابع f روی مجموعه A یکنواست. اگر $A = D_f$ می‌گوییم تابع f روی دامنه‌اش یکنواست.

تذکر تابع ثابت روی هر زیرمجموعه از دامنه‌اش هم صعودی است و هم نزولی. همچنین تابعی که روی مجموعه‌ای هم صعودی است هم نزولی، روی این مجموعه تابعی ثابت است.

تذکر وقتی می‌گوییم «تابع f صعودی است» یعنی این تابع روی دامنه‌اش صعودی است و وقتی می‌گوییم «تابع f نزولی است» یعنی این تابع روی دامنه‌اش نزولی است.


تابع غیریکنوا

اگر تابع f روی مجموعه $A \subseteq D_f$ نه صعودی باشد نه نزولی، روی این مجموعه تابعی غیریکنواست.




مثال


نمودار توابع معروف را در شکل‌های زیر رسم کرده‌ایم. با توجه به نمودار آنها صعودی (اکید)، نزولی (اکید) یا غیریکنوا بودن هر تابع مشخص است.




غیریکنوا، $y = x^2$




اکیداً صعودی، $y = x^3$




غیریکنوا، $y = |x|$




اکیداً صعودی، $y = \sqrt{x}$




اکیداً صعودی، $y = \sqrt[3]{x}$




اکیداً صعودی، $y = a^x, a > 1$




اکیداً نزولی، $y = a^x, 0 < a < 1$




اکیداً صعودی، $y = \log_a x, a > 1$




اکیداً نزولی، $y = \log_a x, 0 < a < 1$



صعودی، $y = [x]$



غیریکنوا، $y = \sin x$




غیریکنوا، $y = \cos x$


تذکر تابع درجه دوم $f(x) = ax^2 + bx + c$ روی $\mathbb{R}$ غیریکنواست.

• اگر $a > 0$ ، تابع f روی بازه $(-\infty, -\frac{b}{2a}]$ اکیداً نزولی و روی بازه $[-\frac{b}{2a}, +\infty)$ اکیداً صعودی است.

• اگر $a < 0$ ، تابع f روی بازه $(-\infty, -\frac{b}{2a}]$ اکیداً صعودی و روی بازه $[-\frac{b}{2a}, +\infty)$ اکیداً نزولی است.



$f(x) = ax^2 + bx + c, a > 0$



$f(x) = ax^2 + bx + c, a < 0$

توابع اکیداً یکنوا و نابرابری‌ها

اگر تابع f روی بازه I اکیداً صعودی باشد، به ازای هر a و b در I ، $a < b \Rightarrow f(a) < f(b)$ و اگر تابع f روی بازه I اکیداً نزولی باشد، به ازای هر a و b در I ، $a < b \Rightarrow f(a) > f(b)$

• تابع‌های $y = x^3$ و $y = \sqrt[3]{x}$ و در حالت کلی تابع‌های $y = x^{2n+1}$ و $y = \sqrt[2n+1]{x}$ ($n \in \mathbb{N}$) روی $\mathbb{R}$ اکیداً صعودی هستند. پس

$$\begin{cases} a < b \Rightarrow a^3 < b^3 \\ a < b \Rightarrow \sqrt[3]{a} < \sqrt[3]{b} \end{cases} \quad \begin{cases} a < b \Rightarrow a^{2n+1} < b^{2n+1} \\ a < b \Rightarrow \sqrt[2n+1]{a} < \sqrt[2n+1]{b} \end{cases}$$

در واقع می‌توان دو طرف نابرابری را (بدون تغییر جهت نابرابری) به توان فرد رساند و یا از آن ریشه فرد گرفت.

• تابع‌های $y = x^2$ و $y = \sqrt{x}$ و در حالت کلی تابع‌های $y = x^{2n}$ و $y = \sqrt[2n]{x}$ ($n \in \mathbb{N}$) روی بازه $[0, +\infty)$ اکیداً صعودی هستند. پس به ازای

هر دو عدد حقیقی و نامنفی مانند a و b ،

$$\begin{cases} 0 \leq a < b \Rightarrow a^2 < b^2 \\ 0 \leq a < b \Rightarrow \sqrt{a} < \sqrt{b} \end{cases} \quad \begin{cases} 0 \leq a < b \Rightarrow a^{2n} < b^{2n} \\ 0 \leq a < b \Rightarrow \sqrt[2n]{a} < \sqrt[2n]{b} \end{cases}$$

• تابع $y = x^2$ و در حالت کلی تابع $y = x^{2n}$ ($n \in \mathbb{N}$) روی بازه $(-\infty, 0]$ اکیداً نزولی هستند. پس به ازای هر دو عدد حقیقی و غیرمثبت مانند a و b ،

$$a < b \leq 0 \Rightarrow a^2 > b^2 \quad a < b \leq 0 \Rightarrow a^{2n} > b^{2n}$$

• اگر $a > 1$ ، تابع $y = \log_a x$ روی $(0, +\infty)$ و تابع $y = a^x$ روی $\mathbb{R}$ اکیداً صعودی هستند. پس

$$x_1 < x_2 \Rightarrow \log_a x_1 < \log_a x_2 \quad x_1 < x_2 \Rightarrow a^{x_1} < a^{x_2}$$

• اگر $0 < a < 1$ ، تابع $y = \log_a x$ روی $(0, +\infty)$ و تابع $y = a^x$ روی $\mathbb{R}$ اکیداً نزولی هستند. پس

$$x_1 < x_2 \Rightarrow \log_a x_1 > \log_a x_2 \quad x_1 < x_2 \Rightarrow a^{x_1} > a^{x_2}$$

نکته

الف) اگر تابع f صعودی باشد و $f(a) < f(b)$ ، آن‌گاه $a < b$.
ب) اگر تابع f نزولی باشد و $f(a) < f(b)$ ، آن‌گاه $a > b$.
ت) اگر تابع‌های f و g صعودی باشند، آن‌گاه تابع $f+g$ صعودی است. اگر تابع‌های f و g نزولی باشند، آن‌گاه تابع $f+g$ نزولی است.

بخش‌پذیری و تقسیم

قضیه تقسیم برای چندجمله‌ای‌ها

فرض کنید $p(x)$ و $s(x)$ دو چندجمله‌ای باشند و $s(x)$ ثابت نباشد. در این صورت چندجمله‌ای‌هایی منحصر به فرد مانند $q(x)$ و $r(x)$ وجود دارند که درجه $r(x)$ از درجه $s(x)$ کمتر است یا $r(x) = 0$ و $p(x) = s(x)q(x) + r(x)$. $q(x)$ را خارج قسمت تقسیم $p(x)$ بر $s(x)$ می‌نامند و $r(x)$ باقی‌مانده این تقسیم است.

اگر در تقسیم چندجمله‌ای $p(x)$ بر چندجمله‌ای $s(x)$ باقی‌مانده برابر صفر باشد، می‌گوییم چندجمله‌ای $p(x)$ بر چندجمله‌ای $s(x)$ بخش‌پذیر است.

قضیه

باقی‌مانده تقسیم چندجمله‌ای $p(x)$ بر چندجمله‌ای $ax+b$ برابر است با $p(-\frac{b}{a})$.

مثال

باقی‌مانده تقسیم چندجمله‌ای $p(x) = 9x^3 + 3x^2 + x + 2$ بر $3x - 1$ برابر است با $3 + \frac{1}{3} + 3(\frac{1}{3})^2 + 9(\frac{1}{3})^3 = \frac{1}{3}$.

چند اتحاد مهم

$$x^n - y^n = (x - y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + \dots + xy^{n-2} + y^{n-1})$$

اگر x و y عددهایی حقیقی باشند و n عددی طبیعی باشد، آن‌گاه


$$x^n + y^n = (x + y)(x^{n-1} - x^{n-2}y + \dots - xy^{n-2} + y^{n-1})$$


و اگر n عددی طبیعی و فرد باشد، آن‌گاه

$$x^n - y^n = (x + y)(x^{n-1} - x^{n-2}y + \dots + xy^{n-2} - y^{n-1})$$

و اگر n عددی طبیعی و زوج باشد، آن‌گاه

ردیف	امتحان نهایی: حسابان ۲	رشته: ریاضی و فیزیک	تألیفی	مدت امتحان: ۷۰ دقیقه
نمره	سؤالات			
۱	درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. الف) تابع f در بازه شامل a و b صعودی است. در این صورت اگر $f(a) < f(b)$ آن گاه $a < b$. ب) چندجمله‌ای $p(x) = (x+1)^3(x-2)^2$ یک چندجمله‌ای از درجه ۵ است. پ) تابع $y = -x^2 + 2x$ روی بازه $(-\infty, 2]$ اکیداً صعودی است.	۰/۷۵	(شهریور ۹۹)	
۲	جای خالی را با عدد یا عبارت مناسب پر کنید. الف) برای آنکه تابع $y = ax + b$ در دامنه‌اش هم صعودی و هم نزولی باشد، مقدار a باید برابر با باشد. (خرداد ۹۹ - خارج) ب) اگر چندجمله‌ای $p(x) = 8x^3 + 4x^2 - kx - 8$ بر $2x - 1$ بخش‌پذیر باشد، آن گاه مقدار k برابر با است. پ) نمودار تابع f در بازه $[1, +\infty)$ است. (یکنوا - غیریکنوا)	۰/۷۵	(خرداد ۹۹ - خارج)	
۳	در چندجمله‌ای $p(x) = x^3 + ax^2 + b$ مقادیر a و b را چنان بیابید که باقی‌مانده تقسیم $p(x)$ بر $x+2$ برابر -1 و $p(x)$ بر $x-1$ بخش‌پذیر باشد.	۱	(دی ۱۴۰۱)	
۴	الف) چندجمله‌ای $x^6 - 1$ را بر حسب عامل $(x+1)$ تجزیه کنید. ب) عبارت $\frac{x^5 + 1}{x + 1}$ را ساده کنید.	۱	(خرداد ۹۸) (دی ۱۴۰۱)	
۵	الف) در $(\frac{1}{3})^{10-2x} \leq (\frac{1}{81})$ ، حدود x را به دست آورید. ب) اگر $\log(x+1) \leq \log(2x-3)$ ، حدود x را مشخص کنید.	۱	(شهریور ۱۴۰۰) (شهریور ۹۸)	
۶	نمودار توابع زیر را رسم کنید و مشخص کنید تابع در چه بازه‌هایی اکیداً صعودی، در چه بازه‌هایی اکیداً نزولی و در چه بازه‌هایی ثابت است. الف) $f(x) = x + x+1 $ ب) $g(x) = \begin{cases} x-2 & x \geq 1 \\ -2 & -1 \leq x < 1 \\ (x+2)^3 & x < -1 \end{cases}$	۲		
۷	الف) تابع نمایی $f(x) = (3k+1)^x$ روی $\mathbb{R}$ اکیداً صعودی است. حدود k را مشخص کنید. ب) تابع $f(x) = 2x^2 - 10x$ روی بازه $(-\infty, a]$ اکیداً نزولی است. حداکثر مقدار a را بیابید. پ) تابع لگاریتمی $f(x) = -\log_2(x+1) - 1$ روی بازه $(a, +\infty)$ اکیداً نزولی است. کمترین مقدار a را بیابید.	۱/۵		
۸	الف) تابعی مانند f با دامنه $[0, +\infty)$ مثال بزنید که $f(2) = 3$ و تابع روی بازه $[0, 2]$ اکیداً نزولی و روی بازه $[2, +\infty)$ اکیداً صعودی باشد. ب) نمودار تابعی با دامنه $\mathbb{R}$ را رسم کنید که در هریک از بازه‌های $(-\infty, 0)$ و $(0, +\infty)$ اکیداً نزولی باشد، اما روی $\mathbb{R}$ اکیداً نزولی نباشد.	۱		
۹	اگر تابع‌های f و g در یک بازه اکیداً صعودی باشند، نشان دهید تابع $f+g$ هم در این بازه اکیداً صعودی است.	۱		
۱۰	موفق و سربلند باشید.	جمع نمره		

ردیف	سؤالات	رشته: ریاضی و فیزیک	تألیفی	مدت امتحان: ۷۰ دقیقه
۱	درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. الف) اگر نمودار تابع $y = x^2$ را سه واحد به چپ و یک واحد به بالا منتقل کنیم، نمودار تابع $f(x) = x^2 + 6x + 10$ به دست می‌آید. ب) نقطه $(-x_0, -y_0)$ از نمودار تابع $y = -f(x)$ متناظر با نقطه (x_0, y_0) از نمودار تابع $y = f(x)$ است. پ) ممکن است تابعی روی دامنه‌اش غیریکنوا اما روی زیرمجموعه‌ای از دامنه‌اش یکنوا باشد. ت) باقی‌مانده تقسیم چندجمله‌ای $P(x) = 9x^3 + 3x^2 + x + 2$ بر $3x - 1$ برابر $P(-\frac{1}{3})$ است.			۱
۲	جای خالی را با عدد یا عبارت مناسب پر کنید. الف) نقطه $(-x_0, -y_0)$ از نمودار تابع متناظر با نقطه (x_0, y_0) از نمودار تابع $y = f(x)$ است. ب) اگر $0 < k < 1$ آن‌گاه نمودار تابع $y = f(kx)$ از نمودار تابع $y = f(x)$ به دست می‌آید. (انبساط افقی - انقباض عمودی) پ) تابع ثابت روی هر زیرمجموعه از دامنه‌اش است. (هم صعودی و هم نزولی - نه صعودی و نه نزولی) ت) اگر $k = \dots\dots\dots$ آن‌گاه چندجمله‌ای $P(x) = 8x^3 + 4x^2 - kx - 8$ بر $2x - 1$ بخش‌پذیر است.			۱
۳	گزینه صحیح را انتخاب کنید. الف) تابع $f(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$ را در نظر بگیرید. نمودار تابع $y = -f(x)$ به کدام صورت است؟  ب) دامنه تابع $y = 3f(2x - 1) + 2$ بازه $[-1, 2]$ است. دامنه تابع $y = f(x)$ کدام است؟ (۱) $[-2, 4]$ (۲) $[-3, 3]$ (۳) $[-1, 5]$ (۴) $[\frac{1}{2}, 2]$ پ) تجزیه عبارت $x^5 + 32$ به کدام صورت است؟ (۱) $(x - 2)(x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 8x + 16)$ (۲) $(x + 2)(x^4 - 2x^3 - 4x^2 - 8x - 16)$ (۳) $(x + 2)(x^4 + 2x^3 + 4x^2 + 8x + 16)$ (۴) $(x + 2)(x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 8x + 16)$ ت) بزرگ‌ترین بازه‌ای که تابع $f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 5$ در آن اکیداً یکنوا است کدام است؟ (۱) $[0, +\infty)$ (۲) $(-\infty, 0]$ (۳) $(-\infty, +\infty)$ (۴) $[1, +\infty)$			۱
۴	تابع زیر را رسم کنید و بزرگ‌ترین بازه‌ای که تابع f در آن صعودی است را مشخص کنید. $f(x) = \begin{cases} 0 & x \leq -5 \\ \sqrt{x+5} & -5 < x \leq 4 \\ -x+1 & x > 4 \end{cases}$			۱
۵	تابع $f(x) = -\cos(x + \frac{\pi}{3})$ روی بازه $[0, a]$ اکیداً صعودی است. حداقل مقدار a را بیابید.			۰/۷۵

ردیف	سؤالات	تألیفی	رشته: ریاضی و فیزیک	امتحان نهایی: حسابان ۲	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
۱	درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. الف) اگر f و g در یک بازه اکیداً صعودی باشند، آن گاه $f - g$ نیز در آن بازه اکیداً صعودی است. ب) دوره تناوب تابع $y = \tan x $ برابر 2π است. پ) اگر n عددی فرد باشد، $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n$ برابر $-\infty$ است. ت) نمودار تابع $y = \frac{x^2 + x}{x^2}$ مجانب قائم ندارد.				۱
۲	جای خالی را با عدد یا عبارت مناسب پر کنید. الف) اگر f تابعی صعودی باشد و $k < 0$ ، آن گاه تابع $y = kf(x)$ تابعی است. ب) دامنه تابع $f(x) = \tan 2x$ برابر است. پ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4 - \frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2} + 2}$ برابر است با ت) اگر $\tan a = 3$ و $\tan(a+b) = 2$ ، مقدار $\tan b$ برابر است.				۱
۳	گزینه صحیح را انتخاب کنید. الف) نمودار تابع g با ضابطه $g(x) = f(2x) - 1$ را یک واحد به سمت راست منتقل می کنیم. سپس طول نقاط این نمودار را نصف و عرض آن ها را دو برابر می کنیم. ضابطه تابعی که نمودار آن به دست آمده کدام است؟ (۱) $y = 2f(4x - 2) - 1$ (۲) $y = 2f(4x - 2) - 2$ (۳) $y = 2f(4x - 1) - 1$ (۴) $y = 2f(4x - 1) - 2$ ب) نمودار تابع $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$ در اطراف نقطه $x=1$ به کدام شکل است؟ (۱) (۲) (۳) (۴)				۰/۵
۴	نمودار تابع $g(x) = f(x-1)$ به صورت مقابل است. نمودار تابع $y = -f(-2x)$ را رسم کرده، دامنه و برد آن را مشخص کنید و تعیین کنید تابع در کدام بازه هم صعودی است و هم نزولی؟ 				۱/۵
۵	الف) نمودار تابع $f(x) = -2 \sin(\frac{x}{2}) + 1$ را در بازه $[-3\pi, 3\pi]$ رسم کنید. ب) دو بازه را که تابع f در آن ها صعودی است مشخص کنید.				۱/۵

ردیف	سؤالات	نمره
۶	باقی‌مانده تقسیم چندجمله‌ای $P(x)$ بر $x^2 - 6x + 8$ برابر $3 - x$ است. باقی‌مانده تقسیم چندجمله‌ای $P(x)$ بر $x - 4$ چقدر است؟	۱
۷	اگر x و y عددهایی متمایز باشند و $x^6 - y^6 = 2(x - y)$ ، حاصل عبارت $(x^6 + y^6 + x^2y^2)(x + y)$ را حساب کنید.	۱
۸	الف) a عددی صحیح و تابع $f = \{(-a^2 - 1, a), (0, 2), (a^2 + 1, 2a + 1)\}$ اکیداً صعودی است. مقدار a را بیابید. ب) مجموعه جواب‌های نامعادله $\log_{5/4}(x + 4) \leq \log_{5/4}(2x + 2)$ را مشخص کنید.	۱/۲۵
۹	مقدار تابع $f(x) = -4 \cos\left(\frac{x}{4}\right)$ الف) در چه نقاطی حداقل است؟ این مقدار را مشخص کنید. ب) در چه نقاطی حداکثر است؟ این مقدار را مشخص کنید. پ) در چه نقاطی صفر است؟	۱/۲۵
۱۰	قسمتی از نمودار تابع $f(x) = a \sin\left(\left(\frac{5}{4} + bx\right)\pi\right)$ به صورت مقابل است. مقدار a و b را بیابید.	۱/۲۵
۱۱	الف) جواب‌های کلی معادله $\cos^4 x - \sin^4 x = \frac{1}{2}$ را به دست آورید. ب) جواب‌های کلی معادله $\tan x \tan 2x = 1$ را به دست آورید.	۲
۱۲	در شکل مقابل $\tan \alpha$ را محاسبه کنید.	۱
۱۳	حاصل حدهای خواسته شده را به دست آورید. ۱) $\lim_{x \rightarrow \left(\frac{\pi}{2}\right)^+} \frac{1 - \tan x}{1 + \sin x}$ ۲) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin 2x}{1 - \cos 2x}$ ۳) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x(x+1)}{(x+1)^2 + (x-1)^2}$	۲
۱۴	الف) مقادیر a و b را طوری تعیین کنید که $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - 4}{x^2 + ax + b} = -\infty$. ب) به ازای چه مقداری از k تابع $f(x) = \frac{x^2 - kx + 1}{x - 1}$ مجانب قائم ندارد؟	۱/۵
۱۵	مجانب‌های افقی و قائم تابع $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 6x + 9}}{x + 2}$ را مشخص کنید.	۱/۵
۱۶	با توجه به نمودار داده شده، حاصل حدهای مورد نظر را بیابید. الف) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ب) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ پ) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$	۰/۷۵
	موفق و سربلند باشید.	جمع نمره
		۲۰

ردیف	سؤالات	نمره
۱۱	اگر $f(x) = \tan^2 x$ ، مقدار $f''(\frac{\pi}{3})$ را تعیین کنید.	۱
۱۲	مقدار ماکزیمم و مینیمم مطلق تابع $f(x) = x^3 - 3x^2$ را روی بازه $[-\frac{1}{3}, 1]$ بیابید.	۱
۱۳	مقادیر a و b را طوری تعیین کنید که نقطه عطف نمودار تابع $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ نقطه $(-2, 15)$ باشد.	۱
۱۴	جدول تغییرات و نمودار تابع $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2$ را رسم کنید.	۲
	موفق و سربلند باشید.	جمع نمره ۲۰

صفحات پاسخ
۱۱۶ تا ۱۱۸

موضوع آزمون
نیمسال دوم (۲)

آزمون

۲۳

امتحان نهایی: حسابان ۲		رشته: ریاضی و فیزیک	تألیفی	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
ردیف	سؤالات			
۱	درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. (الف) مشتق حاصل ضرب دو تابع مشتق پذیر برابر حاصل ضرب مشتق های آن هاست. (ب) مقدار مشتق در هر نقطه اکسترمم نسبی برابر صفر است. (پ) ماکزیمم مطلق تابع پیوسته روی بازه $[a, b]$ در یکی از دو سر بازه به دست می آید. (ت) اگر در یک بازه همه خط های مماس بر نمودار تابع زیر منحنی باشند، جهت تقعر تابع روی این بازه رو به بالاست.			
۲	در جای خالی عدد یا عبارت مناسب قرار دهید. (الف) تابع $y = \sqrt[3]{x}$ در $\mathbb{R}$ مشتق پذیر (ب) اگر $f'(5) = 2$ و $g'(5) = -1$ ، آنگاه $(2f - g)'(5)$ برابر با است. (پ) مجموع طول نقطه های بحرانی تابع $y = x^3 - 6x^2 + x - 1$ برابر با است. (ت) نقطه عطف تابع $y = \sqrt[3]{x-1}$ نقطه است.			
۳	(الف) مقادیر a و b را طوری تعیین کنید که تابع $f(x) = \begin{cases} (x+1)^3 & x \leq 0 \\ ax + a + b & x > 0 \end{cases}$ در $x = 0$ مشتق پذیر باشد. (ب) اگر $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ و $g(-1) = g'(-1) = \frac{1}{3}$ ، مشتق تابع $y = (f \circ g)(x)$ را به ازای $x = -1$ حساب کنید.			
۴	نشان دهید نقطه به طول $x = -1$ ، نقطه گوشه ای برای تابع $f(x) = x^2 + x $ است.			
۵	معادله نیم مماس راست تابع $f(x) = x^2 - 1 $ را در نقطه $x = 1$ بنویسید.			
۶	اگر $f(x) = \sqrt{x+2}$ و آهنگ تغییر لحظه ای تابع f در نقطه $x = -1$ سه برابر آهنگ تغییر متوسط این تابع در بازه $[2, a]$ باشد، مقدار a را به دست آورید.			
۷	مشتق توابع زیر را حساب کنید. (ساده کردن مشتق الزامی نیست) (الف) $f(x) = \frac{6x+2}{x(3x-1)}$ (ب) $f(x) = \frac{\sin x}{2+\cos 2x}$			

ردیف	سؤالات	نمره
۸	نقطهٔ ماکزیمم نسبی تابع $f(x) = \sqrt{-x^3 + 3x^2}$ را مشخص کنید.	۱/۲۵
۹	ماکزیمم مطلق تابع $f(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{x + 2}$ روی بازه $[0, 3]$ چقدر است؟	۱
۱۰	مطابق شکل مقابل می‌خواهیم پنجره‌ای به محیط ۴ متر بسازیم که از یک مستطیل و یک نیم‌دایره تشکیل شده است. مقادیر x و y را طوری تعیین کنید که بیشترین میزان نور از پنجره به درون بتابد.	۱/۵
۱۱	با توجه به نمودار تابع f ، نمودار f' را با ذکر دلیل مشخص کنید.	۰/۷۵
۱۲	جهت تقعر و مختصات نقطهٔ عطف نمودار تابع $f(x) = x(x^2 - 3) + 1$ را تعیین کنید.	۱
۱۳	a را طوری مشخص کنید که نمودار تابع $f(x) = ax^4 + (a-1)x^3 - x + 1$ نقطهٔ عطف نداشته باشد.	۱
۱۴	جدول تغییرات و نمودار تابع $f(x) = \frac{1-3x}{2-2x}$ را رسم کنید.	۲
	موفق و سربلند باشید.	جمع نمره ۲۰

صفحات پاسخ

موضوع آزمون

۲۴

آزمون

۱۱۸ تا ۱۳۱

جامع (۱) - شبیه‌ساز نهایی

ردیف	سؤالات	تألیفی	رشته: ریاضی و فیزیک	امتحان نهایی: حسابان ۲	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
۱	درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. الف) تابع $f(x) = -x^3 + x^2 - 5$ روی بازه $(0, a)$ اکیداً صعودی است. حداکثر مقدار a برابر $\frac{2}{3}$ است. ب) خط $x=1$ مماس قائم بر نمودار تابع $y = \sqrt[3]{1-x}$ در نقطه $(1, 0)$ است. پ) اگر $f(x) = x^3 - 4x^2 + 3x - 1$ ، مقدار $f''(2)$ برابر ۴ است.				۰/۷۵
۲	جاهای خالی را با عدد یا عبارت مناسب پر کنید. الف) اگر $\tan(a-b) = \frac{1}{3}$ و $\tan(a+b) = 2$ ، مقدار $\tan 2a$ برابر با است. ب) اگر f یک تابع باشد و $I \subseteq D_f$ یک همسایگی نقطهٔ c باشد که به ازای هر x متعلق به I داشته باشیم $f(x) \geq f(c)$ ، در این صورت $f(c)$ را یک تابع می‌نامیم. پ) اگر $f(x) = x^2 - x - 2$ و $g(x) = x^3 - 3x$ ، مقدار $(f \circ g)'(-1)$ برابر با است.				۰/۷۵

ردیف	سؤالات	نمره
۳	الف) نمودار تابع $f(x) = \sqrt{x+1} + 2$ در چند نقطه نمودار تابع $g(x) = -(x-1)^3$ را قطع می‌کند؟ (با رسم نمودار) ب) طول نقاط روی نمودار تابع f را دو برابر و عرض آن‌ها را نصف می‌کنیم. سپس نمودار حاصل را دو واحد به سمت راست انتقال می‌دهیم و در آخر آن را نسبت به محور طول‌ها قرینه می‌کنیم. ضابطه تابعی را که نمودار آن رسم شده است، بنویسید.	۱/۲۵
۴	اگر باقی‌مانده تقسیم چندجمله‌ای $P(x) = x^3 - ax^2 + bx - 1$ بر $x-1$ برابر ۳ باشد، باقی‌مانده تقسیم چندجمله‌ای $Q(x) = ax^2 - 2bx + 1$ بر $x-2$ را تعیین کنید.	۰/۵
۵	الف) شکل روبه‌رو قسمتی از نمودار تابع $y = a \cos bx$ است. ضابطه تابع را کامل کنید. ب) نمودار تابع $y = \cos x $ را در بازه $[-2\pi, 2\pi]$ رسم کنید و دوره تناوب آن را مشخص کنید.	۱/۲۵
۶	معادله $\sqrt{3} \tan^2 x + (\sqrt{3}-1) \tan x - 1 = 0$ را حل کنید.	۱
۷	الف) حاصل حدهای زیر را در صورت وجود بیابید. ۱) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x^3} - \frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x}}$ ۲) $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{2 - \sqrt{x+2}}$ ب) با توجه به نمودار تابع f ، مقدار حدهای زیر را مشخص کنید. ۱) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ۲) $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x)$	۱/۵
۸	نشان دهید $x=1$ برای تابع $f(x) = 2 \sqrt{x}-1 $ یک نقطه گوشه‌ای است. (رسم نمودار تابع الزامی نیست).	۱/۲۵
۹	الف) اگر $f(x) = (x^3 - x^2 - 1)(x - \sqrt{x} + 5)$ ، مشتق تابع f را بنویسید. ب) اگر $f(x) = \frac{1}{x}$ و $g(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ ، مقدار $g(-2)$ را بیابید.	۱
۱۰	مشتق‌پذیری تابع $f(x) = \begin{cases} x^2 - x & x \geq 1 \\ x^3 - x^2 & x < 1 \end{cases}$ را در نقطه $x=1$ بررسی کنید.	۱
۱۱	اگر $f(x) = x$ ، $g(x) = x^2$ و $h(x) = \sqrt{x}$ ، مقدار مشتق $(f+h) \circ g$ در نقطه $x=-1$ را به‌دست آورید.	۱
۱۲	خط مماس بر نمودار تابع $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{4x}}$ در نقطه $(2, \frac{1}{2})$ محور y را با کدام عرض قطع می‌کند؟	۱
۱۳	آهنگ تغییر متوسط تابع $f(x) = x^3 - 3x$ در بازه $[0, 1]$ با آهنگ تغییر لحظه‌ای آن در چه نقطه‌ای از این بازه برابر است؟	۱
۱۴	نمودار تابع f در شکل مقابل رسم شده است. الف) طول یک نقطه ماکزیمم نسبی و یک نقطه مینیمم نسبی تابع f را مشخص کنید. ب) طول نقاط ماکزیمم و مینیمم مطلق تابع f را مشخص کنید.	۱/۵
۱۵	اگر مقدار مینیمم نسبی تابع $f(x) = x^3 - 3x^2 + a$ برابر ۳ باشد، مقدار ماکزیمم نسبی آن را به‌دست آورید.	۱/۲۵

۹ توجه کنید که

$$f(x) = 4x^2 + 4x + 1 \Rightarrow f(x) = (2x+1)^2 \xrightarrow{\text{۲ واحد به بالا}}$$

$$y = (2x+1)^2 + 2 \xrightarrow{\text{یک واحد به چپ}}$$

$$y = (2(x+1)+1)^2 + 2 = (2x+3)^2 + 2 \xrightarrow{\text{قرینه نسبت به محور } x}$$

$$g(x) = -((2x+3)^2 + 2) = -(2x+3)^2 - 2$$

۱۰ نقطه (x_0, y_0) روی نمودار تابع f متناظر با نقطه $(x_0, y_0 + a)$ روی نمودار تابع $f+a$ است. بنابراین نقطه به عرض -1 روی نمودار تابع f متناظر با نقطه به عرض $-1+a$ روی نمودار تابع $f+a$ است. در نتیجه $-1+a = -3 \Rightarrow a = -2$

پاسخ تشریحی آزمون (۲)


۱ الف) درست. توجه کنید که اگر خلاف حکم درست باشد، آن گاه $a \geq b$ در این صورت چون f صعودی است. پس $f(a) \geq f(b)$ که تناقض است. بنابراین $a < b$. درست.

$$p(x) = (x^2 - 4x + 4)(x^2 + 3x^2 + 3x + 1) = x^5 + \dots$$

پ) نادرست. توجه کنید که

$$y = -(x^2 - 2x) = -((x-1)^2 - 1) = -(x-1)^2 + 1$$

بنابراین تابع در بازه $(-\infty, 1]$ یا هر زیرمجموعه آن اکیداً صعودی است و روی بازه $[1, +\infty)$ یا هر زیرمجموعه آن اکیداً نزولی است.



۲ الف) صفر. تابعی که هم صعودی و هم نزولی است، تابعی ثابت است. بنابراین باید $a = 0$. ب) -12 .

$$p\left(\frac{1}{2}\right) = 0 \Rightarrow 8\left(\frac{1}{2}\right)^3 + 4\left(\frac{1}{2}\right)^2 - k\left(\frac{1}{2}\right) - 8 = 0$$

$$1 + 1 - \frac{k}{2} - 8 = 0 \Rightarrow k = -12$$

پ) غیریکنوا. اگر تابع f یکنوا باشد، چون در یک همسایگی راست نقطه $x=1$ مقادیر f بیشتر از $f(1)$ هستند، پس تابع صعودی است. اما از روی نمودار معلوم است که مقدار تابع f به ازای مقادیری بزرگتر از 1 منفی است، که تناقض است.

$$\begin{cases} p(-2) = -1 \\ p(1) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -8 + 4a + b = -1 \\ 1 + a + b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4a + b = 7 \\ a + b = -1 \end{cases} \xrightarrow{\times(-1)} \begin{cases} 4a + b = 7 \\ -a - b = 1 \end{cases}$$

$$+ \begin{cases} 4a + b = 7 \\ -a - b = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{8}{5} \\ b = -\frac{11}{5} \end{cases}$$

$$3a = 8$$

$$x^6 - 1 = (-x)^6 - 1$$

$$= (-x-1)((-x)^5 + (-x)^4 + (-x)^3 + (-x)^2 + (-x) + 1)$$

$$= -(x+1)(-x^5 + x^4 - x^3 + x^2 - x + 1)$$


$$= (x+1)(x^5 - x^4 + x^3 - x^2 + x - 1)$$

$$\frac{x^5 + 1}{x+1} = \frac{(x+1)(x^4 - x^3 + x^2 - x + 1)}{x+1} = x^4 - x^3 + x^2 - x + 1 \quad \text{ب)}$$

۶ ابتدا نمودار تابع f را رسم می کنیم و با قرینه کردن آن نسبت به خط $y=x$ ، نمودار تابع $f^{-1}(x)$ را به دست می آوریم.

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x \Rightarrow f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 + 1$$


$$f(x) = (x-1)^3 + 1$$




همچنین ضابطه f^{-1} را به صورت زیر می یابیم.

$$y = (x-1)^3 + 1 \Rightarrow y-1 = (x-1)^3 \Rightarrow \sqrt[3]{y-1} = x-1$$


$$\sqrt[3]{y-1} + 1 = x \xrightarrow{\text{جای } x \text{ و } y \text{ را عوض می کنیم}} y = \sqrt[3]{x-1} + 1$$



۷ توجه کنید که:




همچنین:



۸ توجه کنید که دامنه f برابر است با

برای به دست آوردن برد ابتدا این تابع را به کمک تابع $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ رسم می کنیم.





$$D_f = (-1, +\infty), \quad R_f = [0, +\infty)$$


بنابراین:

با توجه به نمودار واضح است که تابع f در بازه $(-\infty, \frac{5}{4}]$ اکیداً نزولی است. بنابراین حداکثر مقدار a برابر $\frac{5}{4}$ است.

توجه کنید که اگر $f(x) = ax^2 + bx + c$ و $a > 0$ ، آن‌گاه تابع f در بازه $(-\infty, -\frac{b}{2a}]$ یا هر زیرمجموعه از آن، اکیداً نزولی و در بازه $[-\frac{b}{2a}, +\infty)$ یا هر زیرمجموعه از آن اکیداً صعودی است. نمودار تابع f را در چند مرحله به صورت زیر رسم می‌کنیم.



با توجه به نمودار واضح است که تابع در بازه $(-1, +\infty)$ اکیداً نزولی است. بنابراین کمترین مقدار a برابر -1 است.



تابع f را در یک بازه، اکیداً صعودی می‌گوییم، اگر برای هر دو مقدار a و b در این بازه که $a < b$ ، آن‌گاه $f(a) < f(b)$ داریم:

$$a < b \xrightarrow{\text{تابع } f \text{ اکیداً صعودی}} \begin{cases} f(a) < f(b) \\ g(a) < g(b) \end{cases} \xrightarrow{\text{دو طرف نابرابری را جمع می‌کنیم}} \begin{cases} f(a) < f(b) \\ g(a) < g(b) \end{cases}$$

$$f(a) + g(a) < f(b) + g(b) \Rightarrow (f+g)(a) < (f+g)(b)$$

در نتیجه تابع $f+g$ هم در این بازه اکیداً صعودی است.

پاسخ تشریحی آزمون (۳)


۱ الف) درست. دقت کنید که

$$y = x^2 \xrightarrow{\text{۱ واحد به بالا}} y = (x+3)^2 \xrightarrow{\text{۳ واحد به چپ}} y = x^2$$

$$y = (x+3)^2 + 1 = x^2 + 6x + 9 + 1 = x^2 + 6x + 10$$

ب) نادرست. نقاط نمودار تابع $y = -f(x)$ ، قرینه نقاط نمودار تابع $y = f(x)$ نسبت به محور x هستند. بنابراین کافی است عرض نقاط نمودار تابع f را قرینه کنیم. یعنی اگر $(x_0, y_0) \in f$ آن‌گاه $(x_0, -y_0) \in -f$.

ج) درست. به عنوان مثال به نمودار تابع $y = |x|$ دقت کنید. این نمودار روی دامنه‌اش یعنی $\mathbb{R}$ غیریکنوا است (زیرا روی $(-\infty, 0)$ نزولی و روی $[0, +\infty)$ صعودی است) اما روی بازه $(-\infty, 0)$ یکنواست. توجه کنید که این تابع روی هر زیرمجموعه از بازه $(-\infty, 0)$ یا هر زیرمجموعه از بازه $[0, +\infty)$ یکنواست.



۵ الف) توجه کنید که تابع $y = (\frac{1}{3})^x$ اکیداً نزولی است، می‌توان نوشت

$$(\frac{1}{3})^{1-2x} \leq \frac{1}{81} \Rightarrow (\frac{1}{3})^{1-2x} \leq (\frac{1}{3})^4 \xrightarrow{y = (\frac{1}{3})^x \text{ نزولی}} 1-2x \geq 4 \Rightarrow -2x \geq 3 \Rightarrow 2x \leq -3 \Rightarrow x \leq -\frac{3}{2}$$

ب) تابع $y = \log x$ اکیداً صعودی است. بنابراین

$$\log(x+1) \leq \log(2x-3) \xrightarrow{y = \log(x) \text{ صعودی}} x+1 \leq 2x-3 \Rightarrow x \geq 4$$


۶ الف) نمودار تابع f را رسم می‌کنیم.

$$f(x) = x + |x+1| = \begin{cases} x + (x+1) & x+1 \geq 0 \\ x + (-(x+1)) & x+1 < 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 2x+1 & x \geq -1 \\ -1 & x < -1 \end{cases} \quad \begin{array}{c|c} x & y \\ \hline -1 & 0 \\ -1 & -1 \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{تابع ثابت} \end{array}$$

بنابراین نمودار تابع به صورت مقابل است و داریم:
اکیداً صعودی: $[-1, +\infty)$
اکیداً نزولی: $(-\infty, -1]$
ثابت: $(-\infty, -1]$

ب) برای رسم نمودار تابع $y = |x-2|$ نمودار تابع $y = |x|$ را ۲ واحد به سمت راست انتقال می‌دهیم. توجه کنید که قسمتی از نمودار که مربوط به $x \geq 1$ است مورد نظر است. برای رسم نمودار تابع $y = (x+2)^3$ نمودار تابع $y = x^3$ را ۲ واحد به سمت چپ انتقال می‌دهیم. توجه کنید که قسمتی از نمودار که مربوط به $x < -1$ است، مورد نظر است.




با توجه به نمودار تابع داریم:


اکیداً صعودی: $(-\infty, -1), [2, +\infty)$ اکیداً نزولی: $[1, 2]$
ثابت: $[-1, 1)$

۷ الف) توجه کنید که تابع نمایی $y = a^x$ با شرط $a > 1$ اکیداً صعودی است. بنابراین

$$3k+1 > 1 \Rightarrow 3k > 0 \Rightarrow k > 0$$

ب) نمودار تابع به صورت زیر است.





با توجه به نمودار، این تابع در دامنه خود یعنی $(-\infty, +\infty)$ اکیداً صعودی است.

۴ برای رسم تابع سه ضابطه‌ای، هر ضابطه را در دامنه مربوط به خودش رسم می‌کنیم:


$$y = 0, \quad x \leq -5 \quad \text{ضابطه اول}$$

$$y = \sqrt{x+5}, \quad -5 < x \leq 4 \quad \text{ضابطه دوم}$$

برای رسم این قسمت از نمودار، نمودار تابع $y = \sqrt{x}$ را ۵ واحد به سمت چپ

انتقال می‌دهیم و فقط آن قسمتی از نمودار را در نظر می‌گیریم که $-5 < x \leq 4$.

$$y = -x + 1, \quad x > 4 \quad \text{ضابطه سوم}$$



با توجه به نمودار رسم شده، تابع در بازه $(-\infty, -5]$ ثابت یعنی هم صعودی و





هم نزولی است. همچنین تابع در بازه $(-5, 4]$ اکیداً صعودی است، پس

بزرگ‌ترین بازه‌ای که تابع در آن صعودی است، بازه $(-\infty, 4]$ است.

۵ نمودار تابع $y = \cos x$ را $\frac{\pi}{3}$ به سمت چپ انتقال می‌دهیم تا نمودار

تابع $y = \cos(x + \frac{\pi}{3})$ رسم شود. از قرینه کردن نمودار به دست آمده نسبت

به محور x نمودار تابع $f(x) = -\cos(x + \frac{\pi}{3})$ به دست می‌آید.



با توجه به نمودار، تابع روی بازه $[\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$ اکیداً صعودی است. بنابراین $a = \frac{2\pi}{3}$.

ت نادرست. می‌دانیم باقی‌مانده تقسیم چندجمله‌ای $P(x)$ بر چندجمله‌ای $Q(x) = ax + b$ برای $P(\frac{-b}{a})$ است $(\frac{-b}{a})$ ریشه چندجمله‌ای $Q(x)$ است.

پس باقی‌مانده تقسیم چندجمله‌ای $P(x)$ بر $3x - 1$ برابر است با $P(\frac{1}{3})$. زیرا

$$3x - 1 = 0 \Rightarrow 3x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{3}$$

۲ الف $y = -f(-x)$ دقت کنید که

$$(x_0, y_0) \in f(x) \xrightarrow[\text{محور } y]{\text{قرینه نسبت به محور } x} (-x_0, -y_0) \in -f(-x)$$

ب انبساط افقی.

پ هم صعودی و هم نزولی.

ت ۱۲. توجه کنید چندجمله‌ای $P(x)$ بر چندجمله‌ای $2x - 1$ بخش‌پذیر است.



هرگاه $P(\frac{1}{2}) = 0$.

$$P(\frac{1}{2}) = 8(\frac{1}{2})^3 + 4(\frac{1}{2})^2 - k(\frac{1}{2}) - 8 = 0 \Rightarrow -\frac{1}{2}k - 6 = 0$$

$$-\frac{1}{2}k = 6 \Rightarrow k = -12$$

۳ الف گزینه (۱): برای رسم نمودار تابع $y = -f(x)$ کافی است

نمودار تابع $y = f(x)$ را نسبت به محور x قرینه کنیم.



ب گزینه (۲): ابتدا توجه کنید که فقط تغییرات روی x می‌تواند بر دامنه تابع تأثیر بگذارد.

$$y = 3f(2x - 1) + 2, D = [-1, 2] \Rightarrow -1 \leq x \leq 2 \quad \text{را می‌سازیم}$$

$$-2 \leq 2x \leq 4 \xrightarrow{-1} -3 \leq 2x - 1 \leq 3 \Rightarrow D_f = [-3, 3]$$

ب گزینه (۴): توجه کنید اگر n طبیعی و فرد باشد، آن‌گاه

$$x^n + y^n = (x + y)(x^{n-1} - x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 - \dots - xy^{n-2} + y^{n-1})$$

از طرف دیگر $x^5 + 3^5 = x^5 + 2^5$ ، پس کافی است در اتحاد بالا قرار دهیم $n = 5$ و $y = 2$.

$$x^5 + 3^5 = x^5 + 2^5 = (x + 2)(x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 8x + 16)$$

ت گزینه (۳): نمودار این تابع را رسم می‌کنیم. ابتدا توجه کنید که



$$f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 5 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1 + 4$$

$$f(x) = (x + 1)^3 + 4$$

برای رسم نمودار تابع f ، کافی است نمودار تابع $y = x^3$ را ابتدا یک واحد به چپ و سپس ۴ واحد به سمت بالا انتقال دهیم.

(ب) به مراحل تبدیل نمودار دقت کنید:

- (۱) انتقال ۱ واحد به چپ (طول نقاط منهای یک می‌شود).
 - (۲) انقباض افقی (طول نقاط نصف می‌شود).
 - (۳) انبساط عمودی (عرض نقاط دو برابر می‌شود).
 - (۴) قرینه نسبت به محور x (عرض نقاط قرینه می‌شود).
- مراحل بالا را روی نقاط f ، به ترتیب گفته شده انجام می‌دهیم.



۹ برای رسم نمودار تابع f ، ابتدا عبارت‌های داخل قدرمطلق را تعیین علامت می‌کنیم تا بتوانیم $y = |x+2| + |x-1|$ را به صورت چند ضابطه‌ای بنویسیم.

ریشه‌های عبارت‌های داخل قدرمطلق

$$\begin{cases} x+2=0 \Rightarrow x=-2 \\ x-1=0 \Rightarrow x=1 \end{cases}$$

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
$x+2$		$-$	$+$	$+$
$x-1$		$-$	$-$	$+$

$$f(x) = \begin{cases} -x-2+(-x+1) & x < -2 \\ x+2+(-x+1) & -2 \leq x \leq 1 \\ x+2+(x-1) & x > 1 \end{cases} = \begin{cases} -2x-1 & x < -2 \\ 3 & -2 \leq x \leq 1 \\ 2x+1 & x > 1 \end{cases}$$


برای رسم کردن خط $y = -2x - 1$ و خط $y = 2x + 1$ از نقطه‌های کمکی

به صورت زیر استفاده می‌کنیم:

x	-2	-3
$y = -2x - 1$	3	5

x	1	2
$y = 2x + 1$	3	5

بنابراین نمودار تابع به صورت زیر است:



(الف) $[1, +\infty)$

(ب) $(-\infty, +\infty)$. دقت کنید تابع در بخشی از این بازه صعودی اکید و در

بخش دیگر نزولی اکید و در نتیجه در کل این بازه غیریکنوا است.

(پ) $[-2, 1]$. تابع در این بازه ثابت یعنی هم صعودی و هم نزولی است.

(ت) $[-2, +\infty)$. در این بازه ابتدا رفتار تابع به صورت صعودی (تابع ثابت $y = 3$) و سپس به صورت اکیداً صعودی است. در نتیجه در کل بازه رفتار تابع صعودی است.


۶ (الف) اگر f تابعی اکیداً نزولی باشد و $f(a) > f(b)$ آن گاه $a < b$.

تابع $y = (\frac{1}{10})^x$ اکیداً نزولی

$$\left(\frac{1}{10}\right)^{1-2x} > \left(\frac{1}{10}\right)^{4x-2} \Rightarrow \left(\frac{1}{10}\right)^{1-2x} > \left(\frac{1}{10}\right)^{4x-6} \Rightarrow 1-2x < 4x-6 \Rightarrow 12x-6 > 1-2x \Rightarrow 14x > 7 \Rightarrow x > \frac{1}{2}$$

$$12x-6 > 1-2x \Rightarrow 14x > 7 \Rightarrow x > \frac{1}{2}$$



۷ (الف) ۱) تابعی مانند $y = |x|$ یا $y = x^2$ توابعی هستند که در دامنه خود یعنی در $\mathbb{R}$ غیریکنوا هستند. به نمودارهای این دو تابع دقت کنید.




۲) تابعی مانند $y = x^3$ با دامنه $\mathbb{R}$ را در نظر

بگیرید. نمودار این تابع به صورت مقابل است که در تمام $\mathbb{R}$ تابعی صعودی (اکیداً صعودی) و در نتیجه یکنوا (اکیداً یکنوا) است.


همچنین تابع $y = -|x| + |x-1|$ را در نظر بگیرید. نمودار این تابع به صورت زیر است که در تمام دامنه خود (یعنی $\mathbb{R}$) یکنوا (نزولی) است.






۳) توابع ثابت، توابع هم صعودی و هم نزولی هستند. تابعی مانند $y = 3$.



(ب) توجه کنید



۸ (الف) توجه کنید که



۲ الف) نزولی. (۰/۲۵) فرض کنید که a و b عضو دامنه تابع f باشند.

در این صورت

$$a < b \xrightarrow{\text{f صعودی}} f(a) \leq f(b) \xrightarrow{\frac{xk}{k < 0}} kf(a) \geq kf(b)$$

$$2x \neq k\pi + \frac{\pi}{2} \Rightarrow x \neq \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}, (k \in \mathbb{Z}) \quad (۰/۲۵) \quad x \neq \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \quad (ب)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4 - \frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2} + 2} = \frac{4 - 0}{0 + 2} = 2 \quad (۰/۲۵) \quad ۲. ۲ (ب)$$

$$\tan(a+b) = 2 \Rightarrow \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b} = 2 \quad (۰/۲۵) \quad -\frac{1}{y} \quad (ت)$$

$$\frac{3 + \tan b}{1 - 3 \tan b} = 2 \Rightarrow 3 + \tan b = 2 - 6 \tan b$$

$$7 \tan b = -1 \Rightarrow \tan b = -\frac{1}{7}$$

۳ الف) گزینه (۲). (۰/۲۵)

$$\xrightarrow{\text{یک واحد به راست}} g(x-1) = f(2(x-1)) - 1 = f(2x-2) - 1$$




$$\xrightarrow{\text{طول نقاط نصف و عرض نقاط دو برابر}} 2g(2x-1) = 2f(2(2x)-2) - 2 = 2f(4x-2) - 2$$

(ب) گزینه (۳). (۰/۲۵)

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2}{x-1} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2}{x-1} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

۴ توجه کنید که ابتدا نمودار تابع داده شده را یک واحد به سمت چپ انتقال دهیم تا نمودار تابع f را به دست آوریم.



$$\text{برد} = [-1, 2] \quad (۰/۲۵)$$

$$\text{دامنه} = \left[-\frac{1}{2}, 2\right] \quad (۰/۲۵)$$

تابعی که روی بازه‌ای هم صعودی است و هم نزولی، روی این بازه ثابت است.

پس این تابع روی بازه $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ هم صعودی است و هم نزولی. (۰/۲۵)

۱۴ الف) یا باید $x=1$ ریشه مضاعف مخرج باشد یا مخرج ریشه نداشته باشد.

$$x^2 - kx + 1 = (x-1)^2 \Rightarrow x^2 - kx + 1 = x^2 - 2x + 1 \Rightarrow k = 2 \quad (۰/۲۵)$$

$$\Delta < 0 \Rightarrow k^2 - 4 < 0 \quad (۰/۲۵) \Rightarrow -2 < k < 2 \quad (۰/۲۵)$$

$$\text{پس } -2 < k \leq 2 \quad (۰/۲۵)$$

(ب) اگر $x \rightarrow 3^+$ ، آن گاه $x-3 \rightarrow 0^+$. در نتیجه باید حد صورت کسر

عددی منفی شود:

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} (ax^2 + 3) < 0 \quad (۰/۲۵) \Rightarrow 9a + 3 < 0 \Rightarrow a < -\frac{1}{3} \quad (۰/۲۵)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2 \quad (۰/۲۵) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^3 + 3x - 5}{3x^2 - 3x + 1} = 2 \quad (۰/۲۵) \quad ۱۵$$

توجه کنید که اگر $b > 3$ ، آن گاه حاصل حد، صفر می‌شود و اگر $b < 3$ آن گاه حاصل حد برابر بی‌نهایت می‌شود. پس باید $b = 3$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^3}{3x^3} = 2 \quad (۰/۲۵) \Rightarrow \frac{a}{3} = 2 \Rightarrow a = 6 \quad (۰/۲۵)$$

پاسخ تشریحی آزمون (۱۳)

۱ الف) نادرست. (۰/۲۵) اگر $f(x) = g(x) = x$ ، آن گاه f و g روی $\mathbb{R}$



اکیداً صعودی‌اند، اما $f - g$ تابعی ثابت است.

(ب) نادرست. (۰/۲۵) به نمودار این تابع توجه کنید. برای رسم نمودار تابع

$y = |\tan x|$ ، ابتدا نمودار $y = \tan x$ را رسم می‌کنیم. سپس قسمت‌هایی

از نمودار که زیر محور x است را نسبت به محور x قرینه می‌کنیم (توجه کنید

قسمت‌های زیر محور x را باید حذف کرد).



با توجه به نمودار واضح است که دوره تناوب $y = |\tan x|$ برابر π است.

(ب) درست. (۰/۲۵)

(ت) نادرست. (۰/۲۵) $y = 1 + \frac{1}{x}$ ، پس خط $x = 0$ مجانب قائم نمودار تابع است.